

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/ использование этого лекарственного препарата.*

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Этот лекарственный препарат назначен лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку он может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Глицерин**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Глицерин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** глицерол

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

### **Состав**

Один суппозиторий содержит:

Дозировка 1,24 г

*Действующее вещество:* глицерол (в пересчете на 100 % вещество) — 1,24 г.

*Вспомогательные вещества:* натрия стеарат — 0,10 г, вода очищенная — 0,20 г.

Дозировка 2,11 г

*Действующее вещество:* глицерол (в пересчете на 100 % вещество) — 2,11 г.

*Вспомогательные вещества:* натрия стеарат — 0,17 г, вода очищенная — 0,35 г.

### **Описание**

Суппозитории прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичные, торпедообразной формы. Допускается помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки. На срезе допускается наличие воздушного стержня.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство.

**Код АТХ:** A06AX01

МИНЗДРАВ РОССИИ  
ЛН-005434-220319  
СОГЛАСОВАНО

**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Слабительное средство. При применении в виде ректальных суппозиторий смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулирует моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

**Фармакокинетика**

Хорошо всасывается через слизистую оболочку прямой кишки.

Активно метаболизируется в печени. Выводится почками, 7–14 % — в неизмененном виде.

**Показания к применению**

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, когда применение пероральных слабительных препаратов невозможно.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз; после перенесенного инфаркта миокарда, после родов; перед и после хирургических операций на прямой кишке, перед инструментальным и рентгенологическим исследованием прямой кишки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата.

Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, беременность, детский возраст до 5 лет.

**С осторожностью**

Почечная недостаточность, период грудного вскармливания.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания****Беременность**

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

**Период грудного вскармливания**

Неизвестно, проникает ли глицерол в грудное молоко, поэтому в период грудного вскармливания применение препарата возможно только в том случае, если, по мнению врача,



ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

### **Способ применения и дозы**

Ректально.

Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5–10 минут после введения препарата. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

*Взрослым и детям старше 12 лет* назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

*Детям с 5 лет до 12 лет* назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерола, 1 раз в сутки.

Перед и после применения суппозитория необходимо тщательно вымыть руки.

Не следует применять препарат более 7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, *необходимо проконсультироваться с врачом*. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции; местные реакции (зуд, жжение в области ануса); появление спастических болей в области кишечника.

При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, *сообщите об этом врачу*.

### **Передозировка**

*Симптомы:* частый жидкий стул.

*Лечение:* отмена препарата, симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Данные по взаимодействию с другими лекарственными средствами отсутствуют.

### **Особые указания**

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не установлено.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные, 1,24 г или 2,11 г.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

АО «Фармпроект», Россия,

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А.

Тел./факс: +7 (812) 331 93 10

**Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Фармпроект», Россия,

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А.

Тел./факс: +7 (812) 331 93 10

Управляющий

АО «Фармпроект»

С.С.Саакян