

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
КАМЕТОН

Регистрационное удостоверение

Торговое название препарата: Каметон

Лекарственная форма

аэрозоль для местного применения

Описание

Маслянистая жидкость, находящаяся под давлением в баллоне с дозирующим клапаном. Препарат при выходе из баллона распыляется в виде аэрозоля, представляющего собой диспергированные в газовой среде жидкие частицы с характерным запахом.

Состав

Активные вещества: хлоробутанолгидрат по 0,2 г или 0,3 г, камфора по 0,2 г или 0,3 г, L-ментол по 0,2 г или 0,3 г, масло эвкалиптовое по 0,2 г или 0,3 г.

Вспомогательные вещества: изопропилмиристат, хладон-134a (тетрафторэтан)

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ [R02AA20]

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное "отвлекающее" действие.

Показания к применению

Воспалительные заболевания ЛОР-органов (ринит, фарингит, ларингит и др.).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 5 лет).

Способ применения и дозы

Распыляют в ротовую полость и носовые ходы (снимают предохранительный колпачок с распылителя и, введя его в полость рта или носа, нажимают на его основание в течение 1-2 сек). В течение суток ингаляции повторяют 3-4 раза.

Побочное действие

Аллергические реакции.

С осторожностью

Баллон не вскрывать и не нагревать.

Особые указания

При воспалительных заболеваниях носа удобнее пользоваться баллоном с дозирующим клапаном.

Передозировка

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения.

По 30 г или 45 г в баллонах алюминиевых или стеклянных, снабженных дозирующими клапанами, распылителями и защитными колпачками. 1 баллон с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 40 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18

Тел./Факс: (07122) 6-14-65

Представитель

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Директор ИДКЭЛС,
профессор



Е.В. Познякова

В.В. Чельцов