

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Бом-Бенге мазь

Торговое наименование: Бом-Бенге мазь

МНН/группировочное наименование: Метилсалицилат+[левоментол]

● **Лекарственная форма:** мазь для наружного применения.

Состав на 100 г. Действующие вещества: левоментол - 3,9 г, метилсалицилат - 20,2 г. Вспомогательные вещества: вазелин - 68,9 г, парафин (парафинов нефтяных твердых) - 7,0 г

Описание. Мазь от светло-желтого до желтого цвета с запахом левоментола и метилсалицилата.

Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительное средство для наружного применения.

Код АТХ: M02AC.

Фармакологические свойства: Оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие.

Фармакокинетика

При местном применении активные компоненты препарата не абсорбируются в системный кровоток и не оказывают системного действия.

● **Показания:**

Атралгии, миалгии, (мышечные боли) до и после занятий спортом, болевой синдром при заболеваниях околосуставных тканей, люмбаишиалгия, радикулит.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения. Беременность III триместр, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью.

Непереносимость производных салициловой кислоты. Беременность I-II триместр.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Не применяется в период грудного вскармливания и в III триместре беременности. Применение I-II триместрах только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы. Наружно (в виде растираний). Необходимое количество мази (2-4 г, что соответствует объему крупной вишни) втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через

несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) 10 дней.

Применение препарата при первом приеме или при его отмене: нет сведений.

Передозировка. Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества.

Симптомы передозировки: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения центральной нервной системы, такие как головокружение, неустойчивая походка, «приливы» крови к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.

Лечение симптоматическое и поддерживающее: коррекция водно-электролитного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях - переливание крови, гемодиализ.

Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном применении препарата (нанесение на слизистые оболочки, на обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

Побочное действие. В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, кожные аллергические реакции (зуд кожи, крапивница, кожная сыпь) а также ангионевротический отек.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами местного действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Препарат не использовать с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания:

Не допускать попадания на конъюнктиву, другие слизистые оболочки. Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу. Не применять с согревающими компрессами. Сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций - нет сведений.

Форма выпуска. Мазь для наружного применения. По 20, 25, 30, 40, 50 г в алюминиевые тубы с бушонами или тубы из комбинированного материала с бушонами, или тубы ламинатные с бушонами. По 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г в банки или флаконы темного стекла, с навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотняющим элементом или прокладками, или средствами укупорочными полимерными, или в банки стеклянные с треугольным венчиком укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми или по 50, 100 г во флаконы полимерные с крышками с поршнем для выдавливания.

Каждую тубу, банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка туб, банок, или флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек: отпускается без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:


ОАО «Самарамедпром», 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86
Тел./факс (846) 373-81-07.

ОАО «Самарамедпром», 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99 б.
Тел./факс (846) 373-81-08.

ОАО «Самарамедпром», 446246, Самарская обл., Волжский район, пос.г.т. Петра-Дубрава, на территории завода «Коммунар», лит. Б, Б1, здание №2.

Тел./факс (846) 373-81-09

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром»



Н.Л. Стышневa