

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Регистрационный номер:

Торговое название: Перекись водорода

Международное непатентованное название или группировочное название: водорода пероксид

Химическое название: водорода пероксид

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Состав на 100 мл:

Активное вещество: водорода перекись медицинская - от 7,5 до 11 г в зависимости от содержания водорода пероксида в исходном препарате (эквивалентно содержанию водорода пероксида – 3 г)

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная

Описание: бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакологическая группа:

Антисептическое средство.

Код АТХ: [D08AX01]

Фармакологические свойства:

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Наружно в виде 3 % раствора. Местно (на слизистые оболочки) в виде 0,25 % раствора. Для получения 0,25 % раствора препарат разводят водой в соотношении 1:11. Неразбавленный раствор не применять для обработки слизистых оболочек!

Поврежденные участки кожи или слизистых оболочек обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом! Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Побочное действие

Жжение в момент обработки раны, аллергические реакции.

Особые указания

Не рекомендуется использовать препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Обработка раны 3 % раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и другой раневой инфекцией.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 3 %.

По 25, 40 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми с уплотнительными элементами и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

По 10 и 20 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия
153007 г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, 19 а
Тел. (4932)33-42-72.

Генеральный директор
ОАО «Ивановская
фармацевтическая фабрика»



И.Е. Керецман

И.Е. Керецман

