

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Магнелис® В₆**таблетки, покрытые оболочкой**

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 04 09 13 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. Каждая таблетка содержит магния лактата – 470 мг и пиридоксина гидрохлорида – 5 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>Ядро:</i> сахароза - 27,4 мг, каолин – 41,0 мг, акации камедь – 25,0 мг, коллидон SR [поливинилацетат 80 %, повидон 19 %, натрия лаурилсульфат 0,8 %, кремния диоксид 0,2 %] – 34,0 мг, магния стеарат – 6,8 мг, кармеллоза натрия – 34,0 мг, тальк – 6,8 мг. <i>Оболочка:</i> сахароза – 166,7 мг, каолин – 54,0 мг, желатин – 0,9 мг, акации камедь – 4,0 мг, воск пчелиный – 0,4 мг, титана диоксид – 9,0 мг, тальк – 15,0 мг.	Состав на одну таблетку Магния лактата дигидрат - 470 мг в пересчете на магний (Mg ²⁺) - 48 мг Пиридоксина гидрохлорид - 5 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> сахароза - 27,4 мг, каолин - 41,0 мг, акации камедь - 25,0 мг, коллидон SR [поливинилацетат 80 %, повидон 19 %, натрия лаурилсульфат 0,8 %, кремния диоксид 0,2 %] - 34,0 мг, магния стеарат - 6,8 мг, кармеллоза натрия - 34,0 мг, тальк - 6,8 мг; <i>оболочка:</i> сахароза - 166,7 мг, каолин - 54,0 мг, желатин - 0,9 мг, акации камедь - 4,0 мг, воск пчелиный - 0,4 мг, титана диоксид - 9,0 мг, тальк - 15,0 мг.
Показания к применению Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими дефицитными состояниями.	Показания к применению Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими дефицитными состояниями, сопровождающийся такими симптомами, как: повышенная

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует. Срок годности 2 года. Не использовать по истечении срока годности.	раздражительность; незначительные нарушения сна; желудочно-кишечные спазмы; учащенное сердцебиение; повышенная утомляемость; боли и спазмы мышц, ощущение покалывания в мышцах. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение автотранспорта и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



Е.В. Толстова