

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Имудон®

таблетки для рассасывания

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «06» июня 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку Препарат представляет собой поливалентный антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, состав которой соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта и глотки. <u>Активный компонент:</u> Имудон® (смесь лизатов бактерий)-2,7 мг (в пересчете на сухое вещество): <i>в том числе:</i> <i>лизаты бактерий:</i> [L. acidophilus + L. delbrueckii ss lactis + L. helveticus + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + S. sanguis groupe H + S. aureus + E. faecium + E. faecalis + K. pneumoniae ss pneumoniae + F. nucleatum ss fusiforme + C. pseudodiphtheriticum + C. albicans]- 0,1575 мг	Состав на одну таблетку Препарат представляет собой поливалентный антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, состав которой соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта и глотки. <u>Активный компонент:</u> Имудон® (смесь лизатов бактерий) - 2,7 мг (в пересчете на сухое вещество): <i>в том числе:</i> <i>лизаты бактерий:</i> [L. acidophilus + L. delbrueckii ss lactis + L. helveticus + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + S. sanguis groupe H + S. aureus + E. faecium + E. faecalis + K. pneumoniae ss pneumoniae + F. nucleatum ss fusiforme + C. pseudodiphtheriticum + C. albicans] - 0,1575 мг

Старая редакция	Новая редакция
<i>и вспомогательные вещества:</i> глицин - 2,0 мг, натрия дезоксихолат - 0,53 мг, тиомерсал - не более 0,0125 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> глицин, лактозы моногидрат, маннитол, натрия сахаринат, повидон, натрия гидрокарбонат, лимонная кислота безводная, ароматизатор мятный, магния стеарат.	<i>и вспомогательные вещества:</i> глицин - 2,0 мг, натрия дезоксихолат - 0,53 мг, тиомерсал - не более 0,0125 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> глицин - 47,3 мг, лактозы моногидрат - 350 мг, маннитол - 100 мг, натрия сахаринат - 1,12 мг, повидон - 10,0 мг, натрия гидрокарбонат - 30,0 мг, лимонная кислота безводная - 23,0 мг, ароматизатор мятный - 8,0 мг, магния стеарат - 4,88 мг.

Представитель

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»



Е.В. Толстова