

МИНЗДРАВ РОССИИ  
17014990/01- 02 07 18

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Имудон®  
таблетки для рассасывания

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «\_\_\_» 02 07 18 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения</p> <p>Имудон®</p> <p><b>Торговое название:</b> Имудон®</p> <p><b>Группировочное название:</b> Лизатов бактерий смесь [L. acidophilus + L. delbrueckii ss lactis + L. helveticus + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + S. sanguis groupe H + S. aureus + E. faecium + E. faecalis + K. pneumoniae ss pneumoniae + F. nucleatum ss fusiforme + C. pseudodiphtheriticum + C. albicans]&amp;</p> <p><b>Состав на одну таблетку</b> Препарат представляет собой поливалентный антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, состав которой соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта и глотки.</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА</p> <p>Имудон®</p> <p><b>Торговое наименование:</b> Имудон®</p> <p><b>Международное непатентованное или группировочное наименование:</b> лизатов бактерий смесь [L. johnsonii + L. helveticus + L. delbrueckii ss lactis + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + E. faecium + E. faecalis + S. gordonii + S. aureus + K. pneumoniae ss pneumoniae + C. pseudodiphtheriticum + F. nucleatum ss fusiforme + C. albicans]</p> <p><b>Состав</b> Препарат представляет собой поливалентный антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, состав которой соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта и глотки.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p><u>Активный компонент:</u></p> <p>Имудон® (смесь лизатов бактерий) - 2,7 мг (в пересчете на сухое вещество):</p> <p><i>в том числе:</i></p> <p>лизаты бактерий: [L. acidophilus + L. delbrueckii ss lactis + L. helveticus + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + S. sanguis groupe H + S. aureus + E. faecium + E. faecalis + K. pneumoniae ss pneumoniae + F. nucleatum ss fusiforme + C. pseudodiphtheriticum + C. albicans] - 0,1575 мг</p> <p><i>и вспомогательные вещества:</i></p> <p>глицин - 2,0 мг, натрия дезоксихолат - 0,53 мг, тиомерсал - не более 0,0125 мг.</p> <p><u>Вспомогательные вещества:</u></p> <p>глицин - 47,3 мг, лактозы моногидрат - 350 мг, маннитол - 100 мг, натрия сахаринат - 1,12 мг, повидон - 10,0 мг, натрия гидрокарбонат - 30,0 мг, лимонная кислота безводная - 23,0 мг, ароматизатор мятный - 8,0 мг, магния стеарат - 4,88 мг.</p> <p><b>Условия хранения и транспортирования</b></p> <p>Хранят и транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.</p>	<p><u>Действующее вещество:</u></p> <p>Имудон® (смесь лизатов бактерий) - 2,7 мг (в пересчете на сухое вещество)</p> <p>[<i>L. johnsonii + L. helveticus + L. delbrueckii ss lactis + L. fermentum + S. pyogenes groupe A + E. faecium + E. faecalis + S. gordonii + S. aureus + K. pneumoniae ss pneumoniae + C. pseudodiphtheriticum + F. nucleatum ss fusiforme + C. albicans</i>] - 0,1575 мг</p> <p><u>Вспомогательные вещества:</u></p> <p>натрия дезоксихолат - 0,53 мг, тиомерсал – не более 0,0125 мг, глицин - 49,3 мг, лактозы моногидрат - 350 мг, маннитол - 100 мг, натрия сахаринат - 1,12 мг, повидон - 10,0 мг, натрия гидрокарбонат - 30,0 мг, лимонная кислота безводная - 23,0 мг, ароматизатор мятный - 8,0 мг, магния стеарат - 4,88 мг.</p> <p><b>Условия хранения и транспортирования</b></p> <p>Хранят и транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.3332-16 при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.</p>

Представитель  
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»



Е.В. Толстова