

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Желудочный сбор №3****Регистрационный номер****Торговое наименование.** Желудочный сбор №3**Международное непатентованное или группировочное наименование.** ~**Лекарственная форма.** Сбор порошок.**Состав**

Крушины ольховидной кора	30%
Крапивы двудомной листья	30%
Мяты перечной листья	20%
Валерианы лекарственной корневища с корнями	10%
Аира обыкновенного корневища	10%

Описание.

Смесь неоднородных кусочков растительного сырья коричневато-зеленого цвета с белыми, беловато-желтыми, беловато-розовыми, желтовато-оранжевыми, желтовато-коричневыми и коричневыми вкраплениями, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Запах характерный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный, слегка холодящий.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное и мягкое слабительное действие.

Показания к применению.

В качестве симптоматического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся болями спастического характера; запор (в качестве мягкого слабительного средства).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; калькулезный холецистит, кишечная непроходимость, спастические запоры, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, синдром «острого» живота, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 30 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь до еды по 1/2 стакана утром и вечером. Длительность курса лечения зависит от характера заболевания, достигнутого эффекта, характера сопутствующей терапии и определяется лечащим врачом.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможны чувство жажды, головная боль, боли в области сердца, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Возможны коликообразные боли в животе. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор порошок. По 2,0 г сбора порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82

www.krls.ru • krls@krls.ru

Директор по качеству и развитию

АО «Красногорсклексредства»



Трифонова О.Б.