

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ХИЛАК ФОРТЕ

Регистрационное удостоверение:**Торговое наименование:** Хилак форте**Международное непатентованное или группировочное наименование:** метаболиты бактерий *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus helveticus***Лекарственная форма:** капли для приема внутрь**Состав:**100 мл препарата (*без вкуса/со вкусом вишни*) содержат: действующие вещества:

Водный субстрат продуктов обмена веществ

Escherichia coli* DSM 4087 24,9481/ 24,9481 г

Водный субстрат продуктов обмена веществ

Enterococcus faecalis* DSM 4086 12,4741/ 12,4741 г

Водный субстрат продуктов обмена веществ

Lactobacillus acidophilus* DSM 4149 12,4741/ 12,4741 г

Водный субстрат продуктов обмена веществ

Lactobacillus helveticus* DSM 4183 49,8960/ 49,8960 г;

* - субстраты содержат лактозу

вспомогательные вещества: натрия фосфат гептагидрат 1,1590/ 1,1590 г, дикалия фосфат 1,2650/ 1,2650 г, молочная кислота 2,5000-6,2500/ 2,5000-6,2500 г, фосфорная кислота концентрированная 0,3520/ 0,3520 г, калия сорбат 0,1135/ 0,1135 г, кислоты лимонной моногидрат 0,0322/ 0,0322 г, сахарин натрия -/ 0,0200 г, натрия цикламат -/ 0,2000 г, ароматизатор кремовый -/ 0,2000 г, ароматизатор вишневый -/ 0,5000 г, вода до 100 мл.

Препарат содержит 50-70 мг/мл лактозы.

Описание

Препарат без вкуса. Прозрачный или слегка мутный желтовато-коричневого цвета раствор с характерным кисловатым карамелеподобным запахом.

Препарат со вкусом вишни. Прозрачный или слегка мутный желтовато-коричневого цвета раствор с характерным запахом вишни.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейное средство**Код АТХ:** A07FA**Фармакологическое действие**

Естественная физиологическая микрофлора кишечника может быть значительно нарушена путем таких внешних воздействий, как терапия антибиотиками, облучение,

операции на желудке, а также вследствие неподходящего или непривычного питания, изменения воды, смены климата и других условий.

Хилак форте регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует ее состав. Благодаря содержанию в составе **Хилак форте** продуктов обмена нормальной микрофлоры, препарат способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем и позволяет сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника.

Входящие в состав **Хилак форте** биосинтетическая молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают нормальное значение кислотности в желудочно-кишечном тракте независимо от того, страдает ли пациент от повышенной или пониженной кислотности.

На фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием **Хилак форте** нормализуется естественный синтез витаминов группы В и К. Содержащиеся в **Хилак форте** короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях ЖКТ, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

Имеются данные о том, что **Хилак форте** усиливает защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа.

При применении **Хилак форте** отмечается ускорение выведения сальмонелл у грудных детей после сальмонеллезного энтерита, что обусловлено стимуляцией роста ацидофильной анаэробной кишечной флоры и ее последующим антагонистическим воздействием на сальмонеллы.

Показания к применению

- нарушение физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии);
- синдром недостаточности пищеварения, диспепсии;
- диарея, метеоризм, запоры;
- гастроэнтерит, колит; синдром старческого кишечника (хронические, атрофические гастроэнтериты);
- расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванные сменой климата;
- гипо- и анацидные состояния;
- энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени;
- аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема);
- сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в том числе детей грудного возраста).

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;

- дефицит лактазы/изомальтазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата **Хилак форте** в период беременности и лактации считается безопасным. Однако решение о назначении препарата принимает лечащий врач.

Способ применения и дозы

Хилак форте принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости, исключая молоко.

Препарат назначают 3 раза в сутки:

- взрослым: по 40-60 капель (2-3 мл) для препарата во флаконах или 2,2-3,3* мл для препарата в саше на прием;
- детям: по 20-40 капель (1-2 мл) для препарата во флаконах или 1,1-2,2* мл для препарата в саше на прием;
- младенцам: по 15-30 капель на прием.

* для препарата в саше указан объем с учетом избытка за счет 10 % потерь препарата.

Младенцам рекомендуется использовать препарат во флаконах.

После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

Побочное действие

Хилак форте хорошо переносится пациентами любого возраста.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница); запор, диарея.

Передозировка

Никаких специальных мероприятий за исключением обычного медицинского наблюдения не требуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Под влиянием антацидных препаратов возможна нейтрализация молочной кислоты, входящей в состав препарата **Хилак форте**.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием данного препарата с молоком и молочными продуктами.

Препарат содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, врожденной недостаточностью лактазы или мальабсорбцией глюкозы и галактозы не должны принимать этот препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 30 мл, 100 мл, 150 мл (только для препарата без вкуса) во флакон темного стекла, укупоренный пробкой-капельницей из полиэтилена и завинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия или по 30 мл, 100 мл, 150 мл (только для препарата без вкуса) во флакон темного стекла, укупоренный пробкой-капельницей из полиэтилена, завинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия и мерным колпачком.

Флакон вместе с инструкцией по применению в картонной пачке, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

По 1,1 или 2,2 мл препарата в саше из лакированной ламинированной фольги из полиэтилентерефталата/ алюминия/ полиэтилена. По 15, 30 или 60 саше вместе с инструкцией по применению в картонной пачке, на которую дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

Срок годности

Флаконы - 4 года.

После вскрытия флакона - 6 недель.

Саше - 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Наименование держателя (владельца) регистрационного удостоверения
лекарственного препарата**

ратиофарм ГмбХ, Германия

Производитель: Меркле ГмбХ,

Доктор Георг-Шпон-Штрассе 7, 89143 Блаубойрен, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,

тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35

Адрес в интернете: www.teva.ru