

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АнгиоНорм®

Регистрационный номер: ЛС-001137

Торговое наименование: АнгиоНорм®

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Активный компонент: АнгиоНорм® экстракт сухой (получаемый из смеси лекарственного растительного сырья – боярышника плоды, солодки корни, каштана конского семена, шиповника плоды с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на авикулярин 0,50 мг) – 100 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 57,00 мг, крахмал картофельный – 89,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 1,00 мг, стеариновая кислота – 3,0 мг.

Оболочка, полученная методом наращения: сахароза – 141,10 мг, магния гидроксикарбонат – 27,64 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,20 мг, титана диоксид – 2,70 мг, повидон низкомолекулярный – 2,20 мг, тальк – 1,90 мг, краситель тропеолин-О – 0,06 мг.

Мастика для глянцеваания: воск пчелиный – 0,10 мг, парафин жидкий – 0,10 мг.

Описание

Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой желтого цвета, на разрезе видны оболочки желтого и белого цвета, а так же ядро таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, допускаются светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторное средство.

Код АТХ C05C

Фармакологические свойства

АнгиоНорм® обладает выраженной антиагрегационной, антитромбоцитарной активностью, ангиопротекторными и противовоспалительными свойствами, оказывает венотонизирующее и улучшающее микроциркуляцию действие, активизирует диуретическую функцию почек.

АнгиоНорм® оказывает влияние на общее состояние организма: повышает физическую работоспособность, проявляет стресс-протективную активность и умеренный противоболевой эффект.

Показания к применению

В составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов (тромбозы, тромбоэмболии), нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции (тромбозы капилляров), нарушение венозного кровообращения (варикозное расширение вен, посттромботический синдром, тромбозы вен, тромбозы артерий).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые хронические заболевания печени, почек и желудочно-кишечного тракта с нарушением их функций, холелитиаз. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (из-за наличия лактозы и сахаразы). Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Следует соблюдать осторожность при применении препарата лицам с бронхиальной астмой, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

АнгиоНорм® принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения до 3-х недель. Возможно увеличение разовой дозы препарата до 2-х таблеток 3 раза в день в случае хорошей переносимости. Необходимость проведения повторного курса определяется врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции, диспептические расстройства.

В случае возникновения нежелательных реакций при применении препарата необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

При длительном применении препарата АнгиоНорм® в дозах, превышающих рекомендованную суточную дозу, возможно развитие гипокалиемии, повышение артериального давления, появление периферических отеков. Лечение симптоматическое.

В случае возникновения явлений передозировки препарата необходимо срочно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата АнгиоНорм® можно сочетать с другими лекарственными средствами: гиполипидемическими, противовоспалительными, болеутоляющими средствами, антибиотиками, антикоагулянтами прямого и непрямого действия.

Особые указания

При самостоятельном применении препарата не следует превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы, указанные в инструкции.

При отсутствии уменьшения симптомов заболевания или при утяжелении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в одной таблетке содержится 0,023 хлебных единиц (ХЕ), в максимальной суточной дозе – 0,138 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению автомобилем и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 30 таблеток в банки полимерные или в банки полимерные с контролем первого вскрытия и амортизатором.

3 или 10 контурных ячейковых упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ПАО "Отисифарм", Россия,

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

www.otcpharm.ru

Производитель

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д.115

Представитель
ПАО «Отисифарм»



А.А. Усманова