

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕРЕЗЫ ЛИСТЬЯ

Betulae folia

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Березы листья.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Березы листья.

Лекарственная форма. Листья порошок.

Состав. Березы повислой и березы пушистой листья.

Характеристика.

Листья березы содержат эфирное масло, смолы, дубильные вещества, флавоноиды, сапонины и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки листовых пластинок различной формы и черешков. Цвет от зеленого до коричнево-зеленого со светло-зелеными, серо-зелеными и редкими желтовато-коричневыми, желтовато-белыми или коричневыми вкраплениями. Запах своеобразный, слабо ароматный. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой листьев березы оказывает диуретическое (мочегонное) действие.

Показания к применению.

В качестве диуретического средства при отеках сердечно-сосудистого и почечного происхождения.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату или пыльце березы; хроническая почечная недостаточность, острый гломерулонефрит, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-4 недели. Повторные курсы лечения проводят с одно-двухнедельными перерывами по рекомендации врача.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 1 недели или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Листья порошок. По 1,5 г листьев порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82

www.krls.ru • krls@krls.ru

Директор по качеству и развитию
АО «Красногорсклексредства»



Трифонова О.Б.